

Системы линейных алгебраических уравнений

Часть 1. Матричные нормы. Обусловленность

Скалько Юрий Иванович
Цыбулин Иван

Постановка задачи

Дана квадратная матрица \mathbf{A} и столбец \mathbf{b}

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad \det \mathbf{A} \neq 0$$

Решить систему линейных алгебраических уравнений

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

Вырожденные матрицы

Хорошо известно, что не все системы с вырожденными матрицами \mathbf{A} имеют решение. Даже если некоторая система с вырожденной \mathbf{A} имеет решение, достаточно немного изменить правую часть, чтобы нарушить условие совместности.

Поскольку все вычисления производятся с некоторой точностью, то на практике матрица никогда не бывает строго вырожденной ($\det \mathbf{A} = 0$).

Система, близкая к вырожденной

Рассмотрим пример двух немного отличающихся систем

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4.0001 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4.0001 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2.0001 \end{pmatrix}$$

Решения этих систем отличаются уже существенно

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Причина существенного различия в том, что матрица \mathbf{A} «близка» к вырожденной матрице

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Векторные нормы

В пространстве векторов \mathbb{R}^n можно ввести много разных норм. Самыми распространенными в вычислительной математике являются следующие три нормы:

$$\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \max_i |x_i|$$

$$\|\mathbf{x}\|_{\ell_1} = \sum_i |x_i|$$

$$\|\mathbf{x}\|_E = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = \sqrt{\sum_i x_i^2}$$

Векторные нормы

В пространстве векторов \mathbb{R}^n можно ввести много разных норм. Самыми распространенными в вычислительной математике являются следующие три нормы:

$$\|\mathbf{x}\|_{\infty} = \max_i |x_i|$$

$$\|\mathbf{x}\|_{\ell_1} = \sum_i |x_i|$$

$$\|\mathbf{x}\|_E = \sqrt{(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = \sqrt{\sum_i x_i^2}$$

Например, для $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$

$$\|\mathbf{x}\|_{\infty} = 4, \quad \|\mathbf{x}\|_{\ell_1} = 7, \quad \|\mathbf{x}\|_E = 5$$

Подчиненные матричные нормы

Определим норму матрицы $\|\mathbf{A}\|$ таким образом, чтобы для любого \mathbf{x} было справедливо

$$\|\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|, \quad \mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x},$$

причем $\|\mathbf{A}\|$ — минимальное такое число.

Определение

Норма матрицы $\|\mathbf{A}\|$ называется подчиненной векторной норме $\|\mathbf{x}\|$, если

$$\|\mathbf{A}\| = \sup_{\|\mathbf{x}\|=1} \|\mathbf{A}\mathbf{x}\|.$$

В левой части равенства стоит матричная норма \mathbf{A} , а в правой — векторные нормы \mathbf{x} и $\mathbf{A}\mathbf{x}$

Различные векторные нормы порождают различные матричные нормы.

Матричная норма $\| \cdot \|_{\infty}$

Точка $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ с нормой $\|\mathbf{x}\|_{\infty} = 1$ переходит в точку

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$


$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

с нормой $\|\mathbf{y}\|_{\infty} = 5$.

Для остальных точек $\|\mathbf{x}\|_{\infty} = 1$

$$\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_{\infty} \leq 5$$

$$\|\mathbf{A}\|_{\infty} = 5$$



В общем случае

$$\|\mathbf{A}\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a_{ij}|$$

Матричная норма $\|\cdot\|_{\ell_1}$

Точка $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ с нормой $\|\mathbf{x}\|_{\ell_1} = 1$ переходит в точку

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$


с нормой $\|\mathbf{y}\|_{\ell_1} = 5$.

Для остальных точек $\|\mathbf{x}\|_{\ell_1} = 1$

$$\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_{\ell_1} \leq 5$$

$$\|\mathbf{A}\|_{\ell_1} = 5$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$



В общем случае

$$\|\mathbf{A}\|_{\ell_1} = \max_j \sum_i |a_{ij}| = \|\mathbf{A}^T\|_{\infty}$$

Матричная норма $\|\cdot\|_E$

Точка $\mathbf{x} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ с нормой $\|\mathbf{x}\|_E = 1$ переходит в точку

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$


$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

с нормой $\|\mathbf{y}\|_E = 4$.

Для остальных точек $\|\mathbf{x}\|_E = 1$

$$\|\mathbf{A}\mathbf{x}\|_E \leq 4$$

$$\|\mathbf{A}\|_E = 4$$



В общем случае

$$\|\mathbf{A}\|_E = \sigma_{\max}(\mathbf{A}) = \sqrt{\max \lambda(\mathbf{A}^T \mathbf{A})}$$

Матричная норма $\| \cdot \|_E$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -6 & 13 \end{pmatrix}$$

Собственные числа матрицы $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 16$,
ортонормированные собственные вектора

$$\mathbf{x}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\|\mathbf{A}\|_E = \sqrt{16} = 4$$

Особенно просто норма $\| \cdot \|_E$ вычисляется в случае $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$

$$\|\mathbf{A}\|_E = \sqrt{\max \lambda(\mathbf{A}^T \mathbf{A})} = \sqrt{\max \lambda(\mathbf{A}^2)} = \max |\lambda(\mathbf{A})|$$

Число обусловленности системы

Рассмотрим систему

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

и «близкую» к ней систему

$$\mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta\mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta\mathbf{b}$$

Оценим относительную погрешность решения

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\| \|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\| \|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}\|} = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}\|} \frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

Обозначим $\nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}\|}$

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

Назовем $\nu(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ числом обусловленности системы $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Свойства числа обусловленности

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}, \quad \nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}\|}$$

Поскольку $\|\mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b}\|$

$$\nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \geq 1,$$

причем существует такая правая часть \mathbf{b} , что $\nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = 1$. Это именно то значение \mathbf{b} , при котором

$$\|\mathbf{A}^{-1} \mathbf{b}\| = \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b}\|$$

При этом относительная погрешность решения не превосходит относительную погрешность правой части

Произвольная правая часть

Посмотрим, насколько большой может быть величина $\nu(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ в зависимости от \mathbf{b} . С одной стороны,

$$\nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}\|} \geq 1$$

Введем

$$\mu(\mathbf{A}) = \max_{\mathbf{b}} \nu(\mathbf{A}, \mathbf{b})$$

$$\mu(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}^{-1}\| \max_{\mathbf{b}} \frac{\|\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}\|} = \|\mathbf{A}^{-1}\| \max_{\mathbf{x}} \frac{\|\mathbf{Ax}\|}{\|\mathbf{x}\|} = \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\|$$

Таким образом, для произвольной правой части

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \mu(\mathbf{A}) \frac{\|\delta\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}, \quad \mu(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\|$$

Число обусловленности матрицы

Число $\mu(\mathbf{A})$ называется обусловленностью матрицы \mathbf{A} и показывает, насколько матрица «близка» к вырожденной. Поскольку

$$\mu(\mathbf{A}) \geq \nu(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \geq 1,$$

относительная погрешность решения никогда не меньше относительной погрешности правой части. Более того, для любой матрицы \mathbf{A} можно найти такие \mathbf{b} и $\delta\mathbf{b}$, что относительная погрешность решения будет ровно в $\mu(\mathbf{A})$ раз больше относительной погрешности правой части.

Эта погрешность связана с самой задачей решения СЛАУ, а не с конкретным методом ее решения, и ни один численный метод не может решить эту задачу точнее. Поэтому данная погрешность будет *неустранимой*

Спасибо за внимание!

Цыбулин Иван
e-mail: tsybulin@crec.mipt.ru